



LES TRAITEMENTS IMMUNOMODULATEURS DANS LA SCLEROSE EN PLAQUES

)

EFFICACITE ATTENDUE DES TRAITEMENTS IMD

Après au moins une deuxième poussée

Lorsque les Immunomodulateurs sont administrés après au moins une deuxième poussée, ils permettent de diminuer le risque d'une nouvelle poussée de 30%.

	,	,
	,	,
	,	, -
		,
	,	,

*

Intérêt d'un traitement précoce

Lorsqu'ils sont administrés après une première poussée mais avec la certitude que le diagnostic de SEP est confirmé sur les IRMs, ils permettent de diminuer le risque de faire une deuxième poussée de 40 à 50%.

LES DIFFERENTS TRAITEMENTS IMD


			-
			(

PRESENTATION DES PRODUITS

AVONEX (Interféron beta 1a)



Aide à l'injection manuelle:



AVOPEN: stylo injectable à usage unique:



BETA FERON (Interféron beta 1b)

- 1 injection SC de 250mcg tous les 2 jours
- Conservation à température ambiante
- Escalades de doses au début du traitement:
 - 0,25ml X 3
 - 0,50 ml X 3
 - 0,75ml X 3
 - 1ml
- Formes rémittente et SP

Autoinjecteur



FXR, AVIA (Interféron beta 1b)



- 1 injection SC de 250mcg tous les 2 jours
 - Conservation à température ambiante
 - Escalades de doses au début du traitement:
 - 0,25ml X 3
 - 0,50 ml X 3
 - 0,75ml X 3
 - 1ml
- Formes rémittente et SP

REBIF (Interféron beta 1a)

- 1 injection de 22 ou 44mcg en SC 3 fois/semaine
- Conservation au froid
- Escalades de doses:
 - 8,8mcg X 3 pendant 2 semaines
 - 22mcg X 3 pendant 2 semaines puis 44mcgX3
- Formes rémittentes et SP



Rebismart


Rebidose




Rebif



COPAXONE (Acétate de Glatiramer)



- 1 injection SC de 40mgX3/sem.
- Conservation au froid ou à température ambiante (<à 25°)
- Forme rémittente de SEP



Auto injecteur

PLEGRIDY (Peginterféron beta 1a)

-
-

- ° (




EFFETS SECONDAIRES DES TRAITEMENTS

	✓	
	(
	✓	✓
	✓	(
		✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	
		(

Recommandations avant l'injection

- ❖ -
- ❖ -
- ❖ -
- ❖ -
- ❖ -



Les différents sites d'injection

